




令和6年度 宍粟市子どもの予防接種予定表



※ 冊子「予防接種と子どもの健康」や予診票と一緒に配布している説明文書をご覧ください。指定医療機関に電話予約を受けてください。

※ 接種間隔、接種時期に注意してください。接種当日、必ず自宅で体温を測り(昼か朝)、記入した予診票と母子健康手帳を持って来てください。

予防接種の種類	標準的な年齢別接種回数		年齢																						
			2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月	15か月	18か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11~16歳
ロタウイルス <small>経口生ワクチン</small>	ロタリックス 1価	出生6週0日から24週0日後 2回	①	②																					
	ロタテック 5価	出生6週0日から32週0日後 3回	①	②	③																				
ヒブワクチン <small>不活化ワクチン</small>	標準：生後2か月以上7か月未満 初回：生後12月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回接種 追加：初回接種終了後、7月以上の間隔で1回接種		①	②	③								④												
小児用肺炎球菌 <small>不活化ワクチン</small>	標準：生後2か月以上7か月未満 初回：生後12月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回接種 追加：初回接種終了後、60日以上の間隔を置いて生後12月に至った日以降に1回接種		①	②	③								④												
B型肝炎 <small>不活化ワクチン</small>	1歳の誕生日の前日まで 27日以上の間隔を置いて2回接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔(20週目以上)を置いて3回目を接種		①	②						③															
四種混合 <small>※シフテリア・百日せき、破傷風・不活化ポリオの混合ワクチン 不活化ワクチン</small>	生後2か月～7歳6か月に至るまで 1期初回は20日以上の間隔を置いて3回接種 1期追加は1期初回3回目終了後、約1年～1年半後に1回接種		①	②	③								④												
五種混合 <small>※シフテリア・百日せき、破傷風・不活化ポリオ、ヒブの混合ワクチン 不活化ワクチン</small>	★R6.2月以降に生まれたお子さんが対象 生後2か月～7歳6か月に至るまで 1期初回は20日以上の間隔を置いて3回接種 1期追加は1期初回3回目終了後、約1年～1年半後に1回接種		①	②	③								④												
B C G <small>注射生ワクチン</small>	標準：生後5か月～8か月の間に1回接種							①																	
麻しん風しん混合(MR) <small>注射生ワクチン</small>	1期：生後1歳～1歳11か月 1回接種 (1歳を過ぎたら早く接種しましょう) 2期：幼稚園児等の年長児 1回接種												①					②							
水痘 <small>注射生ワクチン</small>	生後1歳～2歳11か月(3か月以上の間隔で接種可) 6か月以上の間隔を置いて2回接種												①		②										
日本脳炎 <small>不活化ワクチン</small>	1期初回：3歳に達した時から4歳に達するまでの期間(6日以上の間隔を置いて2回接種) 1期追加：4歳に達した時から5歳に達するまでの期間 1期初回2回目終了後、6か月以上の間隔で1回接種 2期：9～12歳の間に1回接種(小学4年生のときに個別通知)																①	②	③				④		
二種混合 <small>不活化ワクチン</small>	11歳に達した時から12歳に達するまでの期間に1回接種 (小学6年生のときに個別通知)																								
ヒトパピローマウイルス(HPV) <small>不活化ワクチン</small>	サーバリックス(2価) ガーダシル(4価) シルガード9(9価)	標準：13歳となる属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの女子 ※ワクチンの種類によって接種回数、時期が異なります。																							①②③
おたふくかぜ <small>注射生ワクチン</small>																									
インフルエンザ <small>不活化ワクチン</small>																									

◇ 異なる種類のワクチンを接種する場合の間隔について

注射生ワクチンから注射生ワクチンの間のみ27日以上の間隔をあげる (MR・水痘・おたふくかぜ)
※その他ワクチンの接種間隔については制限がなくなりました。

注：同じ種類のワクチンを複数回接種する際の間隔は従来通りですので、ご注意ください。

《問合せ先》

保健福祉課 TEL62-1000 波賀保健福祉課 TEL75-8800
一宮保健福祉課 TEL72-2100 千種保健福祉課 TEL76-8600